

短 報

Hiroshi IKEDA^a and Hideaki OHBA^b: Typification of *Potentilla* Sect. *Leptostylae* Ser. *Smithianae* (Rosaceae)バラ科キジムシロ属 *Smithiana* 列のタイプ (池田 博^a, 大場秀章^b)

Potentilla Sect. *Leptostylae* Ser. *Smithianae* was originally described by us in 1999 (Ikeda and Ohba 1999), but was not indicated type species. The name is consequently invalid under Art. 37.1 of the Code (Greuter et al. 2000). Here we select type species of the Ser. *Smithianae*.

***Potentilla* L. Sect. *Leptostylae* (Th. Wolf) T.T. Yu & C.L. Li Subsect. *Leptostylae* Ser. *Smithianae* H. Ikeda & H. Ohba in H. Ohba, *Himal. Pl.* 3: 85 (1999), without indicating type species.**

Type species: *Potentilla smithiana* Hand.-Mazz. (designated here).

References

- Greuter W., McNeill J., Barrie F. R., Burdet H. M., Demoulin V., Filgueiras T. S., Nicolson D. H., Silva P. C., Skog J. E., Treharne P. and Turland N. J. 2000. International Code of Botanical Nomenclature (Saint Louis Code). Koeltz Scientific Books, Königstein.
- Ikeda H. and Ohba H. 1999. A systematic revision of *Potentilla* L. Section *Leptostylae* (Rosaceae) in the Himalaya and adjacent regions. In: Ohba H. (ed.), *The Himalayan Plants* 3: 31–117.
- (^aDepartment of Biosphere-Geosphere System Science, Faculty of Informatics, Okayama University of Science, Ridai-cho 1-1, Okayama 700-0005 JAPAN
岡山理科大学総合情報学部
生物地球システム学科,
- ^bDepartment of Botany, University Museum, University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN
東京大学総合研究博物館植物部門)

ツルキンバイの学名 (池田 博)

Hiroshi IKEDA: A Note on Nomenclature of *Potentilla rosulifera* H. Lévl. (Rosaceae)

ツルキンバイは、日本、朝鮮、中国東北部に分布するバラ科キジムシロ属植物である。ツルキンバイの学名には、これまで牧野富太郎が1910年に日本の関東地方産の標本をもとに記載した *Potentilla yokusaiana* が用いられ、朝鮮や中国産のものにもこの学名が適用されてきた。

一方、Léveillé (1909) は、朝鮮の Naipiang で Faurie が採集したキジムシロ属植物を新種として *Potentilla rosulifera* を記載した。Nakai (1911) は *P. rosulifera* に対して「不明種」とし、Nakai (1952) ではヒメヘビイチゴ (*P. centigrana* Maxim.) の異名として扱っている。Lauener (1970), Yü and Li (1985),

Lee (1996) も Nakai (1952) と同様、ヒメヘビイチゴの異名として扱っている。

筆者はエジンバラ植物園所蔵の *P. rosulifera* H. Lévl. のタイプ標本を検討し、これがヒメヘビイチゴではなく、ツルキンバイであることを確認した。ヒメヘビイチゴとツルキンバイは、匍匐枝を出し、通常3出複葉をつける (ツルキンバイは時に5小葉になる) 点では似ているが、ヒメヘビイチゴが匍匐枝上に花をつけるのに対し、ツルキンバイは匍匐枝とは別の直立した茎に集散花序をつけることで異なる。

P. rosulifera H. Lévl. (1909) は、*P. yokusaiana* Makino (1910) に対して優先権が